

ДЕЛИРИЙ: ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

1. АКТИВНО ВЫЯВЛЯЙТЕ ДЕЛИРИЙ



- Боль
- Запор
- Инфекция
- Полипрагмазия
- Изменение обстановки
- Оперативное вмешательство
- Дегидратация
- Иммобилизация
- Алкоголь

Делирий -
используйте
шкалу
оценки
спутанности
сознания

3. ОРИЕНТИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА



- ЧАСЫ, КАЛЕНДАРЬ



- ОЧКИ



- СЛУХОВОЙ АППАРАТ

2. ПРИВЛЕКАЙТЕ РОДСТВЕННИКОВ

- Прислушайтесь к семье / друзьям / сиделке, когда они жалуются на спутанность сознания пациента
- Уточните у родственников, какие лекарства принимает пациент
- Разрешите визиты родственников, семейные фото
- Минимизируйте переводы из отделения в отделение



4. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

- Выявляйте и отменяйте препарат, который может провоцировать делирий



5. СОН

- Создайте условия для сна пациента

